

TEMEX[®] emulgel

Dispositivo medico
con Uviox 3%

TEMEX Emulgel è un dispositivo medico ricco di ingredienti attivi (Uviox, Escina, Centella, Eparina, Diosmina, Esperidina, Bromelina) utile nel trattamento dermofunzionale nei casi di stasi veno-linfatica (turgore mammario). Indicato anche nel trattamento del senso di gonfiore e affaticamento degli arti, nelle tumefazioni localizzate dovute alle alterazioni di natura infiammatoria o traumatica (contusioni, distorsioni, ematomi o infiammazioni delle guaine tendinee), nella pannicolopatia edematosa (cellulite).

Uviox

E' un principio attivo ottenuto da bioliquefazione di vinacce fresche di uva rossa, selezionate tra le più ricche in biofenoli e provenienti da agricoltura biologica certificata. Assicura un elevato potere antiossidante grazie all'elevata solubilità in acqua ed alla stabilità dei biofenoli che lo compongono. Migliorano la microcircolazione contrastando il ristagno di liquidi e la carenza di ossigenazione che porta progressivamente all'alterazione della struttura connettivale ed elastica del tessuto.

Composizione: Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Menthyl Lactate, PPG-25 Laureth-25, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Ethylhexyl Olivates, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Hydrolyzed Grape Fruit, Citric Acid, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Phospholipids, Pentylene Glycol, Dipotassium phosphate, Escin, Potassium phosphate, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Phenoxyethanol, Centella Asiatica Extract, Sodium Heparin, Diosmine, Hesperidin, Ananas Comosus, Carbomer, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Imidazolidinyl Urea.

Modalità d'uso: Applicare un'adeguata quantità di Temex Emulgel sulle zone da trattare due o più volte al giorno massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.

Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto, evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate e ai raggi solari.

Avvertenze: Uso esterno. Tenere fuori dalla portata e vista dei bambini. Non applicare su cute lesa. Nel caso di ipersensibilità si consiglia di sospendere l'uso del prodotto. Una volta aperto il prodotto consumare entro sei mesi. Non utilizzare durante l'allattamento.

NICKEL TESTED<0,00001%